



Hersteller: UAB „Biodinamika“ Vytenio 46, 03229 Vilnius, Lithuania, Tel. +370 615 999 50
 Vertrieb durch: Selton GmbH, Hans-Duncker-Straße 9, 21035 Hamburg
 Tel. +49 40 7367 7568-4

www.selton-gmbh.de | bio@selton-gmbh.de

Biodinamika

AGROLINIJA-S

Organischer Dünger - AGROLINIJA-S

Konzentrierte Formel



Konzentriertes Düngemittel der organischen Herkunft und Konditionierer des Bodens ist aus Kompost des Fleischhies-Dungs und Leonardit / Huminsäuren gemäß der innovativen Technologie hergestellt.

Düngemittel AGROLINIJA-S ist bestimmt für:

- Düngung der Pflanzen über Blätter;
- Verarbeitung von Samen und Pflanzmaterial;
- Verwendung als Premix, für die Verbesserung der Aktivität von sonstigen Nahrungsmitteln, wenn sie zusammen verwendet werden;
- Bereicherung und Verbesserung der Bodenstruktur.

Verwendung und Normen:

- Für das Sprühen über Blätter 1:120 verdünnen, Norm - 2,0-3,0 l/ ha/ ~250 l - H₂O 2 Male während der Vegetation;
- Für Samenverfälschung - 1 l/ 0,5 - 1,0 l Konzentrat / 10 l - H₂O;
- Vor dem Aussaat oder Pflanzen, für Gießen in den Boden 5 l - 8 l/ ha;
- Für die Verarbeitung der Wurzel von Keimlingen und Setzlingen der Pflanzen die Lösung 1:300 verdünnen;
- Über Gießsysteme, für das Gießen in die Wurzelzone 1:150 verdünnen, nicht öfter als jede 10-14 Tage verwenden;
- Das Produkt kann man als Premix verwenden, wobei es mit Pestiziden / Mineraldünger gemischt wird. Es wird empfohlen, vor dem Mischen ihre Verträglichkeit zu prüfen.

Passend für die ökologische Produktion gemäß den Anforderungen der Verordnung des Rates (EG) Nr. 834/2007 und der Verordnung der Kommission (EG) Nr. 889/2008. Das Produkt Agrolinijsa-S ist in den FiBL Register – Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland -, Demeter International, Demeter Germany, ECOVIN, Gaa Germany, FiBL Inputs list for the organic agri-culture, Naturland Germany eingetragen.



Vorteile der Verwendung AGROLINIJA-S:

- Düngung der Pflanzen über Blätter 2-3l/ ha;
- Erhöhung der Keimfähigkeit der Samen;
- Erhöhung der Ertragsfähigkeit der landwirtschaftlichen Produkte (bis 30 %, je nach der Ertragsfähigkeit der Gesäte und der Böden) und Verbesserung der Dekorativität von Pflanzen der Blumenzucht;
- Erhöhung der Qualität von landwirtschaftlichen Produkten (Erhöhung des Glutengehalts, Erhöhung der Qualität, Erhöhung des Zucker-, Öl-, Stärke-, Vitamingehalts, Erhöhung der Kornqualität, Erniedrigung des Nitratsgehalts);
- Erhöhung der Effektivität der Verwendung von Makro- und Mikroelementen;
- Erhöhung der Effektivität der Verwendung von chemischen und biologischen Pflanzenschutzmitteln (man kann ihren Gehalt um 10-30 % vermindern);
- negativen Einfluss von chemischen Düngemitteln und Pestiziden vermindern;
- Beschleunigung der Reifung um 7-10 Tage;
- Erhöhung der Widerstandsfähigkeit gegen ungünstigen Umwelteinflüssen;
- Infektionsrisiko der Entstehung der phytopathogenen Mikroflora vermindern;
- Verbesserung von physikalischen und chemischen Eigenschaften des Bodens, Zusammenbinden von Schwermetallen und giftigen chemischen Elementen.

Empfehlungen für Aufbewahrung und Verwendung: Am wind- und sonnenlosen Tag, am besten am Morgen oder am Abend sprühen. Man kann beim Tau oder nach dem Regen sprühen.

Das Düngemittel vor der Verwendung mischen. Es wird empfohlen, die vorbereitete Lösung binnen 48 Stunden zu verwenden.

Lagerung: Das Produkt ist nicht gefährlich, es enthält keine chemischen oder mineralischen Zusätze. Nicht entzündlich. Physikalisch und chemisch stabil, filtriert, geeignet für Sprühen mit modernen automatisierten Sprinklern. Geeignet für Transportieren. Es wird empfohlen, in Temperatur 0 - 35°C zu aufbewahren, vor direkten Sonnenstrahlen zu schützen. Gültigkeit - 24 Monate.

Düngungsempfehlungen für einzelne Kulturen:


KULTUR	Empfohlene Verdünnungsnorm	EMPFOHLENE PHASEN DER DÜNGUNG „ÜBER BLÄTTER“
Winterweizen	1:100	1 Sprühen - 3-4 Blättchen, Periode der Staudenbildung 2 - Periode der Knotenbildung, 3 - Periode der Haarbildung
Winterraps	1:100	1 Sprühen - 3-6 Blättchen 2 - Periode der Butonisation, 3 - Periode der Schotenbildung
Weizen, Hafer, Gerste	1:100	1-3-4 Blätter, Periode der Staudenbildung , 2 - Periode der Knotenbildung, 3 - Periode der Haarbildung
Sonnenblume	1:150	1-2-4 Periode der Entstehung von Blättchen, 2 - Anfang des Blühens
Mais	1:130	1-3-6 Blättchenperiode, 2 - Anfang der Haarbildung
Buchweizen	1:180	1 - Periode der unteren Blüthen, 2 - Massenblühen
Hülsenkulturen (Soja, Bohne, Erbse)	1:100	1-2 Periode von einigen Blättchen, 2 - Anfang des Blühens
Zuckerrübe	1:100	1-4-6 Periode der Blätter, 2 - nach 10-15 Tagen
Wurzelfrüchte (Möhre, Rettich, Rübe)	1:100	1-3-4 Periode der Blätter, 2 - nach 15 Tagen
Tomate, Paprika, Aubergine	1:200	1-3-5 Tage nach dem Pflanzen der Setzlinge, 2 - Anfang des Blühens
Kohl	1:200	1-10-15 Tage nach dem Pflanzen der Setzlinge, 2 - Anfang der Kopfbildung
Kartoffel	1:200	1 - nach der Bildung des Blätterwerks, 2 - Anfang des Blühens
Zwiebel, Knoblauch	1:100	1 - nach der Bildung des Blätterwerks, 2 - nach 12-15 Tagen
Wassermelone, Gurke, Zucchini	1:100	1-4-6 Blätter, oder 3-5 Tage nach dem Pflanzen der Setzlinge, 2 - Anfang des Blühens
Weintraube	1:150	während der Vegetation vor dem Blühen 2-3 Male jede 10-14Tage sprühen.

Grunddüngungstechnologien

Winterweizen – Die Produktstandards sind auf 1 Hektar festgelegt


Dressing – AGROLINIJA-S 1,0-2,0 l eine Tonne Samen

Zusammen mit RSM – AGROLINIJA-BIOGEL 5,0-8,0 l/ ha



Winterraps – Die Produktstandards sind auf 1 Hektar festgelegt


Zusammen mit RSM – AGROLINIJA-BIOGEL 5,0-8,0 l/ ha



Weizen, Hafer, Gerste – Die Produktstandards sind auf 1 Hektar festgelegt


Dressing – AGROLINIJA-S 1,0-2,0 l eine Tonne Samen

Zusammen mit RSM – AGROLINIJA-BIOGEL 5,0-8,0 l/ ha



Mais – Die Produktstandards sind auf 1 Hektar festgelegt

Zusammen mit RSM – AGROLINIJA-BIOGEL 5,0-8,0 l/ ha



Aufbewahrung und Verwendung: Nicht an windigen und sonnigen Tagen sprühen, vorzugsweise morgens oder abends. Mischen Sie den Dünger vor Gebrauch. Es wird empfohlen, die vorbereitete Lösung innerhalb von 48 Stunden zu sprühen. **Lagerung:** Das Produkt ist nicht gefährlich, keine chemischen oder mineralischen Zusätze. Nicht brennbar. Stabile physikalische und chemische Zustände, gefiltert, geeignet zum Sprühen mit modernen Sprinklersystemen. Es wird empfohlen, bei 0 - 35 ° C zu lagern. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht. **Gültigkeit** - 24 Monate.