

UA AGROLINIJA-S

Концентроване добриво органічного походження та кондиціонер для ґрунту вироблене з гною великої рогатої худоби та леонардиту / гумінової кислоти за інноваційною технологією.

Добриво AGROLINIJA-S призначено для:

- Удобрення рослин через листя;
- Оброблення насіння та саджанців;
- Застосування у вигляді преміксу для поліпшення активності інших продуктів підживлення, коли вони застосовуються разом;
- Збагачення та поліпшення структури ґрунту.

Склад добрива AGROLINIJA-S (сухий залишок):

pH – 8,6 (Концентрат)	
Щільність	1025 г/л
Органічні речовини	54%
Маса сухої речовини	5,6%
Загальний вміст азоту (N)	3,75%
Загальний вміст фосфору (P)	1,96%
Загальний вміст калію (K)	7,15%
Гумінові кислоти	45,2%
Фульвова кислота	13,75%
Амінокислоти	5%
Ca, Mg, Na, S, Fe, B, Co, Cu, Mo, Mn, Zn	< 1%

Застосування та норми:

- Для оббризування листя розводити у співвідношенні 1:120; норма - 2-3 л концентрованого добрива на 200-250 л води на 1 гектар; використовувати двічі впродовж вегетації;
- Для обробки насіння на 1 т – 0,5-1 л концентрованого добрива розчинити в 10 л води;
- Перед висіванням або посадкою: для поливання ґрунту 5 – 8 л на 1 гектар;
- Для оброблення коріння ростків та саджанців рослин розчиняти у співвідношенні 1:300;
- Для зрошувальних систем: для поливу кореневої зони розчиняти у співвідношенні 1:150, використовувати не частіше, ніж раз на 10-14 днів;
- Продукт можна використовувати як премікс, для цього він змішується з пестицидами / мінеральним добривом. Перед використанням рекомендовано перевірити сумісність та придатність до засвоювання.

Придатний для вирощування екологічної продукції згідно вимогам постанови ради ЄС № 834/2007 та постанови Єврокомісії № 889/2008. Продукт AGROLINIJA-S внесений у реєстр FiBL – перелік засобів, дозволених для використання в екологічному землеробстві в Німеччині, а також він відповідає вимогам таких об'єднань, як:

- Demeter International
- Demeter Germany
- ECOVIN Germany
- Gää Germany
- FiBL Inputs list for the organic agriculture
- Naturland Germany.



Переваги використання AGROLINIJA-S:

- Можливість живлення рослин через листя;
- Підвищення схожості насіння;
- Підвищення стійкості врожаю (до 30% залежно від якості насіння та ґрунту);
- Поліпшення зовнішнього вигляду рослин у квітництві;
- Підвищення якості сільськогосподарської продукції (підвищення вмісту глютену, підвищення якості та вмісту цукру, олії, крохмалю, вітамінів, підвищення якості зерна, зменшення вмісту нітратів);
- Підвищення ефективності використання макро- та мікроелементів;
- Підвищення ефективності використання хімічних та біологічних засобів захисту рослин, кількість яких можна зменшити на 10-30%;
- Зменшення негативного впливу хімічних добрив та пестицидів;
- Прискорення дозрівання на 7-10 днів;
- Зменшення ризику розвитку фітопатогенної мікрофлори;
- Поліпшення фізичних та хімічних властивостей ґрунту через зменшення вмісту важких металів та отруйних хімікатів.

Рекомендації щодо зберігання та використання. Розпилювати за безвітряної та хмарної погоди, бажано вранці або ввечері. Розпилювати можна також за наявності роси або після дощу. Добриво змішувати безпосередньо перед застосуванням. Підготовлений розчин рекомендовано використати впродовж 48 годин.

Умови зберігання. Продукт є безпечним, він не містить хімічних або мінеральних додатків. Не горить. Фізично і хімічно стабільний, фільтрований, придатний до оббризування сучасними автоматизованими спринклерами. Придатний до транспортування. Рекомендовано зберігати за температури 0-30°C в місцях, захищених від прямих сонячних променів.


Рекомендації щодо підживлення деяких культур:

Культура	Рекомендований розчин	Рекомендовані фази для удобрення «через листя»
Пшениця озима	1:100	1е оббризування - 3-4 листочки, період формування стебла 2е – період формування зав'язей 3е – період колосіння
Рапс озимий	1:100	1е оббризування- 3-6 листочки 2е – формування бутонів 3е – формування стручків
Пшениця, овес, жито	1:100	1е – 3-4 листочки, , період формування стебла 2е – період формування зав'язей 3е – період колосіння
Соняшник	1:150	1е – поява листочків 2е – початок цвітіння
Кукурудза	1:130	1е – 3-6 листочків 2е – початок формування волосків
Гречка	1:180	1е – період нижніх квіточок 2е – загальне цвітіння
Бобові (соя, горох, квасоля)	1:100	1е і 2е – поодинокі листочки 3е – початок цвітіння
Цукровий буряк	1:100	1е – 4-6 листочків, 2е – за 10-15 днів
Коренеплоди (морква, редька, редиска, ріпа)	1:100	1е – 3-4 листочки, 2е – 15 днів
Томати, паприка, баклажани	1:200	1е – за 3-5 після висадки розсади, 2е – початок цвітіння
Капуста	1:200	1е – за 10-15 днів після висадки розсади, 2е – початок формування качана
Картопля	1:200	1е – після формування листків, 2е – початок цвітіння
Цибуля, часник	1:100	1е – після формування листків, 2е – за 12-15 днів
Кавуни, огірки, кабачки	1:100	1е – 4-6 листочків або 3-5 день після посадки, 2е – початок цвітіння
Виноград	1:150	Протягом вегетації до початку цвітіння оббризувати 2-3 рази не частіше, ніж раз на 10-14 днів


Технологія удобрення ґрунту:

Озима пшениця – технологія розрахована на 1 га

Обробка – AGROLINIJA-S 1-2 л на 1 т насіння




Озимий рапс – технологія розрахована на 1 га



Пшениця, овес, ячмінь – технологія розрахована на 1 га

Обробка – AGROLINIJA-S 1-2 л на 1 т насіння



Кукурудза – технологія розрахована на 1 га

