



ОСНОВНІ ПРАВИЛА І РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВНЕСЕННЯ KTS®

- Tessenderlo Kerley International

ЛИСТОВІ ВНЕСЕННЯ KTS® НА ФРУКТОВИХ ДЕРЕВАХ



На фруктових деревах при внесенні по листу потрібно дотримуватися таких правил:

- Концентрація по листку KTS не повинна перевищувати 1-1,5% (наприклад, щоб внести 5 л KTS® потрібно додати 350-500 л води)
- Можна змішувати із ЗЗР, попередньо виконавши перевірку на сумісність, а також з мікроелементами.
- Не вносити у фазу цвітіння, починати внесення можна, коли опали пелюстки
- Робити 2-4 *внесення* за сезон, при цьому остання обробка проводиться не пізніше, ніж за 2 тижні до збору врожаю
- Не вносити, якщо температура повітря вища за +27°C
Рекомендується вносити вранці чи ввечері
- Не змішувати з кислотами та кальцієм
- *Мінімум 2* внесення за сезон, пізні внесення ефективно впливатимуть на забарвлення плодів

ЛИСТОВІ ВНЕСЕННЯ KTS® НА ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУРАХ

На польових культурах при внесенні по листку потрібно дотримуватися таких правил:

- Концентрація KTS по листку на польових культурах не має перевищувати 5-10%. Приблизно 10 – 20 л KTS на 200/250 л води (залежно від культури)
- Можна змішувати із ЗЗР, попередньо перевіривши на сумісність, а також із мікроелементами
- Не вносити по листку на культури, чутливі до сірки (наприклад, кукурудза)
- Вносити *1-3 рази за сезон*, при цьому дотримуючись рекомендованих фаз внесення для кожної культури
- Не вносити, якщо температура повітря вище +27°C
- Не змішувати з кислотами та кальцієм



ВНЕСЕННЯ KTS® З ФЕРТИГАЦІЄЮ



При фертигації суворо дотримуватись наступних рекомендацій:

- Не змішувати у баку з кислотами
- Не змішувати у баку з кальцієм
- Рекомендації під фертигацію розробляються індивідуально під господарство та культуру
- Не зберігати розчин у баку після змішування більше тижня
- Не застосовувати на гідропоніці
- Перед застосуванням промити систему фертигації водою без добрив
- Дотримуватись рекомендацій щодо зберігання