


ПОЛІПШЕНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР



Цільовий об'єкт	Допосівний період	13	21–29	30	31–34	37–39	51–59	61–69	71–77	83–92
		3 листок	Кущення	Вихід у трубку	1, 2, 3, 4 міжвузля	Прапорцевий листок	Колосіння	Цвітіння	Молочна стиглість	Повна стиглість
Хлібна жужелиця, злакові мухи, попелиці	БРИГІД, 0,4–0,6 л/т									
Кореневі гнилі, сажкові хвороби, септоріоз, пліснявіння насіння	КЕВЛАР, 1,5 л/т									
Снігова пліснява, кореневі гнилі, пліснявіння сходів										
Однорічні, в т.ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х, та деякі багаторічні дводольні бур'яни		САТІС, 0,4–0,6 л/га								
Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни		ХЕПІ СТАР, 0,015–0,025 л/га								
Борошниста роса, септоріоз, іржа (види)		МІЛАНІТ, 0,5–0,7 л/га								
Бура іржа, борошниста роса, септоріоз, плямистості, альтернаріоз, фузаріоз колосу, септоріоз колосу					ЛІКОРІС, 0,5–0,75 л/га					
Озима совка, хлібна жужелиця, клоп шкідлива черепашка, хлібні туруни, трипси, хлібні блішки, попелиці, злакові мухи		НІРВАНА, 1,0–1,5 л/га								
Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, хлібні блішки, злакові мухи, трипси		АКІНАК, 0,15–0,25 л/га								
Десикація										СПЕКА, 2,0–2,5 л/га
Допоміжні речовини для покращення ефективності роботи препаратів (ПАР, ад'юванти)		Ерато, 0,05–0,15 л/га								

СТАНДАРТНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР



Цільовий об'єкт	00–09 Допосівний період	13 3-й листок	21–29 Куцнення	30 Вихід у трубку	31–34 1, 2, 3, 4 міжвузля	37–39 Прапорцевий листок	51–59 Колосіння	61–69 Цвітіння	71–77 Молочна стиглість	83–92 Повна стиглість
Хлібна жужелиця, злакові мухи, попелиці Кореневі гнилі, сажкові хвороби, септоріоз, пліснявіння насіння	БРИГІД, 0,4–0,6 л/т									
Снігова пліснява, кореневі гнилі, пліснявіння сходів	КЕВЛАР, 1,5 л/т									
Однорічні, в т.ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х, та деякі багаторічні дводольні бур'яни		САТІС, 0,4–0,6 л/га								
Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни		ХЕПІ СТАР, 0,015–0,025 л/га								
Борошниста роса, септоріоз, пліснявіння, кореневі гнилі			КАРБОН, 0,5 л/га							
Бура іржа, борошниста роса, септоріоз, фузаріоз колосу, попередження переростання				БЛОК, 0,5–1,0 л/га						
Кореневі гнилі, плямистості, борошниста роса, іржа				КЕВЛАР, 0,5 л/га						
Септоріоз, іржа, борошниста роса, фузаріоз, альтернаріоз				Азоксі-Стар, 0,5–0,8 л/га						
Озима совка, хлібна жужелиця, клоп шкідлива черепашка, хлібні туруни, трипси, хлібні блішки, попелиці, злакові мухи		НІРВАНА, 1,0–1,5 л/га								
Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, хлібні блішки, злакові мухи, трипси					АКІНАК, 0,15–0,25 л/га					
Десикація									СПЕКА, 2,0–2,5 л/га	
Допоміжні речовини для покращення ефективності роботи препаратів (ПАР, ад'юванти)					Мегалип, 0,15–0,2 л/га					