

КОМПЛЕКСНИЙ АДСОРБЕНТ ТА ІНАКТИВАТОР МІКОТОКСИНІВ, ТОКСИНІВ КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ

10.9-33144015-001:2018
AB-07773-04-18
ГОСТ 23462-95

ДЛЯ ТВАРИННИЦТВА ТА ПТАХІВНИЦТВА

PFSorb+

ПФ Сорб Плюс



ПРИЗНАЧЕННЯ

КОМПЛЕКСНЕ ВИРІШЕННЯ

для комплексного вирішення адсорбції та інактивації полярних (афлатоксин, охра-токсин та інші), неполярних мікотоксинів (зеараленон, вомітоксин /ДОН/, фумонізін, Т-2 та інші)



ПРОФІЛАКТИКА ДИСПЕПСІЇ

ПОКРАЩЕННЯ ТРАВЛЕННЯ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ

сприяє перетворенню високотоксичних продуктів в менш токсичні, допомагаючи тим самим стабілізації мікробіоценозу, покращенню травлення та продуктивних задатків тварин і птиці, їх життєздатності



РОЗВАНТАЖЕННЯ

розвантажує систему детоксикації організму, прискорює виділення ксенобіотиків, продуктів їх біо-трансформації, небажаних метаболітів, продуктів перекисного окислення ліпідів



ПІДВИЩЕННЯ ІМУНІТЕТУ

зменшує дію стресу, окисдування і агресивної дії вільних радикалів, підсилює редокс-реакцію печінки і активність травних ферментів надає ефект імуностимулятора, пребіотики, а також гепатопротектору

ВПЛИВ МІКОТОКСИНІВ НА РІЗНІ ВИДИ ТВАРИН

ПРОЯВИ		AFLATOXIN B1	OCHRATOXIN D	FUMONISIN B1	ZEARALENONE	T2 TOXIN	VOMITOXIN (DON)
ПТИЦЯ	Відмова від корму; ураження слизових та шкіри; ураження шлунка; діарея					•	•
	Атрофія тимуса; дистрофія м'язів кінцівок та шлунка	•				•	•
	Імуносупресія; жирна, уражена та збільшена печінка	•	•	•		•	•
	Підвищене споживання води		•				
	Ураження та гіпертрофія нирок	•	•	•			
	Кіста яєчників, затримка статевого дозрівання, ембріональна смертність				•		
	Патології оперення; зниження виводимості	•				•	•
	Низька якість шкаралупи					•	•
	Зниження приростів та яйценоскості	•			•	•	•
СВИНІ	П'ятна крові та тканинні включення в яйцях					•	•
	Відмова від корму, рвота, ураження та некрози слизових оболонок					•	•
	Ураження та некроз печінки	•	•	•			
	Подавлення імунної системи	•	•	•		•	
	Набряк легень			•			
	Ураження та запалення почок, збільшення споживання води	•	•				
	Безпліддя; кіста яєчників; гіпертрофія матки; почервоніння та випадіння вульви; гіпертрофія яєчок у плідників				•		
	Дисплазія суглобів				•	•	•
	Діарея					•	•
ВРХ	Погіршення апетиту, відмова від корму	•			•	•	
	Ураження шкт; гастроентерит				•		
	Кишкові кровотечі	•	•		•		
	Мастит; діарея	•				•	
	Зниження приросту		•				
	Зниження молочної продуктивності	•	•	•		•	
	Стерильність плідників; відсутність циклів овуляції корів				•		
	Скорочення овуляції; вагініти; порушення структури матки; кіста яєчників			•			
	Аборти	•		•			
	Рання загибель телят	•					
	Діарея	•			•	•	
	Кульгавість					•	

СКЛАД: 1 КГ МІСТИТЬ ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ:

- **HSCAS** (адсорбуючі алюмосилікати) – 650 г;
- **Екстракт дріжджів *Saccharomyces cerevisiae*** (маннанолігосахариди, бета – глюкани) – 200 г;
- **Гепатопротектор, сілімарин, ліпотропні речовини** – 100 г;
- **Допоміжні речовини: органічні кислоти, антиоксиданти, антиспікахи та інші** – до 1000 г;

ДРІБНА ФРАКЦІЯ КОЛЬОРОМ ВІД СВІТЛО - СІРОГО ДО СІРОГО

колір може змінюватися від партії до партії, що не вказує на зміну якості кормової суміші

ДОЗУВАННЯ:

Вноситься у комбікорми під час їх виготовлення безпосередньо або через премікси на комбікормових заводах чи в кормо – цехах, шляхом рівномірного змішування залежно від ступеня контамінації кормів мікотоксинами.



Птахівництво

1,0 ÷ 3,0 кг/тн ПК



Кролівництво

3,0 ÷ 5,0 кг/тн ПК



Поросята віком до 5 – 6 тижнів

3,0 ÷ 5,0 кг/тн ПК



Свині на відгодівлі, свиноматки

1,0 ÷ 3,0 кг/тн ПК



Телята, нетелі, бички, сухостій та молочне стадо

1,0 ÷ 3,0 кг/тн ПК, або 25 ÷ 50 гр/гол на добу

Профілактична доза: 1,0÷2,0 кг/тн ПК



поліпропіленові або паперові мішки
по 25,0 кг



Зберігати в закритій упаковці, в прохолодному та сухому приміщенні



Термін придатності
12 місяців
в оригінальній упаковці