



ТОВ «ПРАЙМФІД»

ΔΙΔΕΣΑΝ ΙΟΔΥΜ

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА
САНІТАРНО – ДЕЗІНФІКУЮЧА ДЕЗОДОРУЮЧА СУМІШ

DIDESAN

IODUM

СКЛАД: Triiodomethane (CHI_3) = 0,1+0,15%;
ефірні олії (Gum-tree, Forest pine та інші);
мінеральні з'єднання: алюмосилікати та інші.



**НЕ ЗАСТОСОВУВАТИ
У ВІВЧАРСТВІ**



**ПРЕПАРАТ НЕ МАЄ
ПЕРІОДУ КАРЕНЦІЇ**



**НЕ ШКІДЛИВИЙ
ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ**

Суміш в кольоровій
гамі від світло-сірого
до сірого

ЗАСТОСУВАННЯ:

Дезінфекція та санітарна обробка обладнання і приміщень де утримують свиней, ВРХ, птахів та хутрових звірів, осушувач підстилки, профілактика маститів, профілактика захворювань ратиць (сухі копитні ванни), покращення мікроклімату. Є високоефективним дезінфікуючим і дезодоруючим засобом, поглинає запахи аміаку, сірководню, метану та інших шкідливих виділень і газів, справляє виражену бактерицидну, протівірусну, протигрибкову та ларвіцидну дію, абсорбує вологість в місцях застосування. Препарат наносять на поверхню підлоги, обладнання в приміщеннях для вирощування свиней, ВРХ, птахів та хутрових звірів, методом посипання вручну або за допомогою спеціального пристрою для розпилювання сухих речовин.

Встановлена висока ефективність суміші проти таких збудників як: *E.coli*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp*, *Actinobacillus spp*, *Bordetella bronchiseptica*, *Brucella spp*, *Clostridiaespp*, *Haemophilus parasuis*, *Mycoplasma spp*, *Pasteurella multocidia*, *Salmonella spp*, *Lawsonia spp*, *Leptospirae spp*, *Mycobacterium tub*, *Brac/*



ДОЗУВАННЯ: Препарат можна застосовувати у присутності тварин та птиці, після проведення початкової механічної очистки приміщення або безпосередньо наносити на підстилку та забруднені чи вологі місця методом рівномірного посипання препарату з розрахунку:

- 50/100г на 1м² раз в тиждень.
- У приміщеннях з глибокою підстилкою, перед її поновленням: 100 г на 1 м²
- На об'єктах з низьким рівнем гігієни: 50/100г на 1м² 2-3 рази на тиждень.



паперові або
поліпропіленові
мішки по 10 і 20 кг.



Зберігати 24 місяці в оригінальній
упаковці, в сухому, темному місці
при температурі від +5°C до +25°C.



**НЕ ЗМІШУВАТИ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ
ТА СУМІШАМИ, ЩО МІСТЯТЬ ВАПНО ЧИ НАТРІЙ**

